

イソトレチノイン(アクノトレン)



イソトレチノインはビタミンA誘導体の一種を成分とするニキビの内服薬です。ニキビの原因となる毛穴の詰まりを抑制する作用、皮脂の分泌を抑える作用、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用などがあり、**治療の効果が非常に高く重度ニキビに対して有効な内服薬**です。

ニキビの根本治療薬としてアメリカをはじめとする海外では30年以上前から使用され「**にきび治療薬の切り札**」とも言われています。

【こんな方におすすめ】

- 難治性で何度も繰り返すニキビにお悩みの方
- 重症なニキビにお悩みの方
- 抗生剤内服や外用薬の塗布など、保険治療を行ってもニキビの改善が乏しい方
- 年数単位で長期的にニキビの緩和を目指したい方
- 酒さの方で、保険適応の内服薬や外用薬で症状の改善が見られない方

★イソトレチノイン(アクノトレン) 30日分 ¥17,000

- 用法用量: 1日1回朝食後に1錠内服してください
※1錠/日で開始して、症状を見ながら 40mg 2錠1日に増量する場合があります。
- 治療期間: 治療期間はおおよそ16~24週間です。
※治療が終了した後は軽度再発することもあり、外用薬などによる再発予防のための維持治療が必要です。

★血液検査 1回 ¥2,500 (内服前、内服1ヶ月後、内服3ヶ月後)

内服には事前及び治療中に血液検査が必要となります。

※他院での採血結果を持参された方は、血液検査が不要になる場合があります。

【治療の受けられない方】

- 妊娠中の方、妊娠の可能性がある方、妊娠を希望されている方
- 授乳中の方
- 18歳未満の方や成長期で身長が伸びている方
- イソトレチノイン、トレチノイン製剤、ビタミンAでアレルギーを起こしたことのある方
- テトラサイクリン系の薬剤(ミノマイシンのビブラマイシン®など)を内服されている方
- うつ病その他の精神病態で治療中の方
- 肝機能障害のある方
- 中性脂肪、コレステロールの高い方
- ビタミンA過剰症の方

【服用における注意点】

- 服用期間中と服薬後1カ月間に性行為をする場合は、必ず避妊を行ってください。また服用期間中とその後 1カ月間は妊娠、授乳、献血をしないでください。
- レーシックを受けられる予定の方や、手術を行う予定のある方は事前に申告をお願いいたします。